CISTOS HEPÁTICOS

IBRAFIG

O que são ? Os cistos hepáticos são cavidades ou bolhas preenchidas por líquido claro, límpido e incolor - semelhante a água - dentro do fígado. Eles são achados frequentemente encontrados nos exames de imagem abdominais de rotina, tais como ultrassonografia ou tomografia computadorizada. São na grande maioria das vezes benignos com evolução também benigna. Podem ter tamanhos variados, serem solitários ou associados à presença de outros cistos no fígado e nos rins.

Qual é a sua causa ? A maioria das lesões conhecidas como cistos simples são decorrentes de defeitos congênitos que ocorrem durante a formação dos nossos órgãos e tecidos. Eles podem ser achados em qualquer faixa etária. Quando são múltiplos e associados a presença de cistos nos rins são chamados de doença policística hepática e renal. Uma pequena porcentagem deles – chamados de cistos hidáticos - estão associados a infestação por um parasita denominado *Echinococus*, que é transmitido aos humanos por cães domésticos, que se alimentam de carcaças de ovinos, bovinos e animais de caça. Muito raramente, um tipo de tumor chamado cistoadenoma pode se apresentar como cisto hepático. Diferentemente do cisto simples, o cistoadenoma se apresenta com sangue ou material escuro dentro do cisto, paredes irregulares e septos, facilmente identificados ao exame de imagem.

Quais os sintomas ? Os cistos hepáticos simples frequentemente não causam sintomas, porém quando estes cistos crescem mais que 10 cm pode ocorrer dor abdominal ou sensação de peso na região do fígado. A doença hepática policística, poderá apresentar-se com vômitos, massas palpáveis na região do fígado ou dor abdominal.

Como diagnosticar? O diagnóstico é realizado por um exame de imagem, sendo a ultrassonografia abdominal o mais frequente. Quando precisamos avaliar alterações no conteúdo e na forma destes cistos, inicialmente vistos à ultrassonografia, pode haver necessidade da solicitação de um exame mais específico tipo tomografia ou ressonância magnética do abdômen por vezes com a utilização de contraste (utiliza-se contraste para melhor visualização da forma e do conteúdo dos cistos).

Quais as complicações ? A maioria dos cistos simples são achados incidentais ao exame de imagem, não provocam sintomas e não tem potencial para apresentar quaisquer complicações. Raramente os cistos podem complicar com sangramento ou infecção. Doença policística hepática pode levar a compressão de órgãos e estruturas vizinhas e causar dor abdominal.

Procure sempre um hepatologista.

#NÃO AMARELE

tudosobrefigado.com.br